



Covid-19 deja calvicie y disfunción eréctil

THE INDEPENDENT
LONDRES

La pérdida de cabello y la disfunción eréctil se han unido a la lista de síntomas prolongados por el covid-19, de acuerdo con una nueva investigación publicada en la revista *Nature Medicine*.

El estudio encontró que si bien los síntomas más comunes incluyen pérdida del olfato, dificultad para respirar y dolor en el pecho, otros incluyen amnesia, disfunción eréctil, alucinaciones, incapacidad para realizar movimientos u órdenes familiares, incontinencia intestinal e hinchazón de extremidades.

Los patrones de síntomas tienden

a agruparse en síntomas respiratorios, salud mental y problemas cognitivos, luego en una gama más amplia.

Además, los investigadores también identificaron grupos y comportamientos claves que ponen a las personas en mayor riesgo de desarrollar covid prolongado.

Se estima que un récord de 2 millones en Gran Bretaña sufre de covid prolongado, según la Oficina de Estadísticas Nacionales.

Alrededor de 3.1 por ciento sufre síntomas que persisten durante más de cuatro semanas después de contraer la enfermedad.

En ese país, unas 376 mil personas que contrajeron coronavirus por primera vez al comienzo de la pandemia informaron de que sus sín-

tomos duraron al menos dos años. El estudio sugiere que las mujeres, las personas más jóvenes y las que pertenecen a un grupo de raza negra, mestiza u otro grupo tienen un mayor riesgo de desarrollar covid prolongado.

Además, quienes tienen antecedentes de fumadores, con sobrepeso y obesos, así como los que viven con una amplia gama de afecciones de salud tenían más probabilidades de presentar síntomas persistentes.

El autor principal, el doctor Shamil Haroon, profesor clínico asociado de salud pública en la Universidad de Birmingham, señaló que "esta investigación valida lo que los pacientes han estado diciendo a los médicos y legisladores durante

la pandemia: que los síntomas de covid prolongado son extremadamente amplios y no pueden explicarse completamente por otros factores, como los de riesgo por el estilo de vida o las condiciones de salud crónicas.

"Los síntomas que identificamos deberían ayudar a los médicos y a los desarrolladores de pautas clíni-

cas a mejorar la evaluación de los pacientes con efectos a largo plazo de covid-19 y, posteriormente, considerar cómo se puede manejar mejor esta carga de síntomas".

La pandemia ha dejado 6 millones 385 mil 518 muertes y 570 millones 787 mil 712 contagios, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

El avance del virus

- **6 millones 628 mil 541** casos confirmados
- **190 mil 597** activos
- **17 millones 472 mil 649** notificados
- **10 millones 98 mil 537** negativos
- **5 millones 737 mil 82** recuperados
- **327 mil 109** defunciones

Ocupación hospitalaria:

Camas generales, 18%
Con ventilador, 5%

Vacunación:

Todas las edades: 93 millones 282 mil 942 (79%)

Mayores de 18 años: 81 millones 184 mil 448 (91%)

De 12 a 17 años: 8 millones 229 mil 765 (62%)

De 5 a 11 años: 3 millones 868 mil 729 (25%)

Refuerzos: 56 millones 735 mil 854 (70%)