




PRI exige a Ssa vacunas para grupo LGBTTTI+

Diputados llaman a prevenir la viruela del mono entre la comunidad diversa



MARÍA CABADAS

—nacion@eluniversal.com.mx

El PRI en la Cámara de Diputados urgió a la Secretaría de Salud (Ssa), a garantizar vacunas a la comunidad LGBTTTI+ para evitar más casos de la viruela del mono.

“Hacemos un exhorto al secretario de Salud [Jorge Alcocer Varela] y al subsecretario Hugo López-Gatell, a hablar del tema. Hay una gran cantidad de miembros de la comunidad LGBTTTI+, que piden el acceso a las vacunas, ya que 90% de los casos se han dado entre hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres”, expresó la diputada federal del tricolor Cynthia López Castro.

Hace unos días, la Ssa confirmó, al corte del 31 de julio, 91 casos de la enfermedad, así como otros 236 probables.

Recordó que en Estados Unidos ya se declaró ese padecimiento como una emergencia sanitaria, por lo que pidió tomar cartas en el asunto.

Los síntomas de viruela símica pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, musculares

y de la espalda, inflamación de los ganglios linfáticos, escalofríos, agotamiento, síntomas respiratorios, como

dolor de garganta y congestión nasal o tos.

Un sarpullido que podría ubicarse en el área genital o cerca del pene, testículos, vagina y labios vaginales o el ano. También podría aparecer en otras partes, como manos, pies, pecho, cara o la boca.

El sarpullido pasará por varias etapas que incluyen la formación de costras antes de sanar y puede verse como granos o ampollas; podría ser doloroso o causar picazón.

Se pueden presentar todos o algunos de los síntomas y suelen aparecer dentro de las tres semanas de la exposición al virus. Si alguien tiene síntomas similares a los de la influenza, presentará el sarpullido entre uno y cuatro días. ●

CYNTHIA LÓPEZ CASTRO

Diputada federal del PRI

“Hay una gran cantidad de miembros de la comunidad LGBTTTI+, que piden el acceso a las vacunas [contra la viruela símica]”



Diputadas dicen que 90% de los casos se dan entre hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres.