



Emiten alerta por viruela; hay 49 casos

La Secretaría de Salud emitió una alerta epidemiológica ante el aumento de casos de mpox, antes conocida como viruela del mono.

Aunque hasta el momento en nuestro país no se han registrado casos con la nueva variante —clado 1b— de viruela símica que circula en África, esta enfermedad sigue presente en nuestro país.

Hasta el pasado 3 de agosto, se tenían registrados 212 casos probables, de los cuales, 49 están confirmados y se encontraban distribuidos en once entidades, informó la Secretaría de Salud.

Luego de la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en torno a que el creciente número de contagios en África ya es una emergencia de salud pública internacional, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave) publicó un aviso epidemiológico.

“El objetivo del aviso es que las unidades médicas en todo el país vigilen y notifiquen los casos probables para reducir las cadenas de contagio y proporcionar a las personas enfermas atención

PROPAGACIÓN DE MPOX

La Secretaría de Salud hace estas recomendaciones a la población:



Lavarse las manos de forma frecuente, con agua y jabón o solución alcohol gel.



Cubrir nariz y boca con la parte interna del codo al estornudar o toser.



Usar mascarilla médica



Lavar la ropa, toallas, utensilios para comer y sábanas usadas por una persona enferma, utilizando agua tibia y detergente.



Limpiar y desinfectar espacios en los que se haya encontrado una persona enferma.



Evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos.



Solicitar atención médica y evitar el contacto con otras personas en caso de presentar síntomas.



Evitar el contacto con las lesiones, pero, si éstas se deben tocar, hay que utilizar guantes y desecharlos de forma correcta.

médica de forma oportuna.

“Conave retoma las definiciones operacionales de caso probable, confirmado y descartado con base en las recomendaciones de la OMS”.

La dependencia federal añadió que se cuenta con un Plan de Respuesta para el abordaje de mpox y con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para notificar los casos.

La Secretaría de Salud señaló que la mpox presenta dos periodos clínicos que, generalmente, se quitan sin complicaciones entre dos y cuatro semanas después de iniciar los síntomas.

“La primera fase que se desarrolla en los primeros cinco días se caracteriza por fiebre, dolor de cabeza intenso, ganglios inflamados, dolor de la espalda baja, dolores musculares y falta de ganas de moverse o hacer alguna actividad física.

La segunda fase es la de aparición de pequeñas ampollas, que inicia los días -uno y tres - después del inicio de la fiebre. Aquí aparecen las distintas fases de sarpullido que, por lo general, afectan primero la cara y posteriormente se extiende al resto del cuerpo.

— Patricia Rodríguez Calva