



# MÉXICO CONCENTRA 82% DE LAS DEFUNCIONES OPS emite nueva alerta por persistencia de sarampión

MONTSERRAT MALDONADO

**En 2025 en el continente hubo 14 mil 891 casos confirmados de sarampión contra 466 de un año antes**

**L**a Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó una nueva alerta epidemiológica ante la continua transmisión del sarampión en la región de las Américas.

La alerta destaca la continua aparición de brotes en varios países de todo el continente americano en un contexto de aumento sostenido en 2025 en comparación con los cinco años anteriores.

En 2025, la región notificó 14 mil 891 casos confirmados de sarampión, incluidas las defunciones, en 13 países: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Lo anterior representa un aumento de 32 veces en comparación con los 466 casos notificados en 2024.

México concentró 24 de las 29 de las muertes por sarampión registradas. Dos muertes ocurrieron en Canadá y tres en Estados Unidos.

Sin embargo, datos de la Secretaría de Salud federal indican que el año pasado en México se reportaron 25 muertes por sarampión: 21 en Chihuahua, dos en Jalisco, una en Sonora y una más en el estado de Durango. De acuerdo con las autoridades, solo 3.8 por ciento de estas defunciones contaban con antecedente vacunal verificado a través de la cartilla nacional de salud.

La OPS agregó en la nueva alerta que durante las primeras tres semanas de 2026 se confirmaron mil 31 casos adicionales de sarampión en siete países: Bolivia (10), Canadá (67), Chile (1), Esta-

dos Unidos (171), Guatemala (41), México (740) y Uruguay (1). Esto es un aumento de 43 veces en comparación con los 23 casos notificados durante el mismo periodo en 2025.

De acuerdo con el organismo, entre los casos confirmados, 78 por ciento

no estaban vacunados y 11 tenía un estado de vacunación desconocido.

Si bien la mayor proporción de casos se produjo entre adolescentes y adultos jóvenes, las tasas de incidencia más altas se observaron en bebés menores de un año, seguidos de los niños de 1 a 4 años y de 5 a 9 años. Por ello, la OPS subrayó la necesidad de completar los esquemas de vacunación y emplear medidas de protección adicionales en entornos de brotes.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que, durante 2025, se notificaron más de 552 mil casos sospechosos de sarampión en 179 países, de los cuales casi el 45 por ciento (247 mil 623) fueron confirmados, lo que refleja un resurgimiento mundial de la enfermedad en medio de persistentes deficiencias en la vacunación.

Ante la nueva alerta epidemiológica, la OPS recomendó a los países fortalecer la vigilancia y la detección activa de casos, incluyendo el diagnóstico de laboratorio; implementar las actividades complementarias de vacunación para poder cerrar las brechas de inmunidad y asegurar una respuesta oportuna ante cualquier caso sospechoso de sa-



rampion.

En el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y otras concentraciones multitudinarias con alta movilidad poblacional, la OPS recomienda que los países aumenten la sensibilidad de sus sistemas de vigilancia mediante la implementación de la búsqueda activa de casos para detectar con antelación la presencia o ausencia de casos de sarampión y rubéola.

## DEFUNCIONES


**ESTE AÑO** México ya registró su primera defunción por sarampión en Michoacán, un hombre de 64 años con alcoholismo crónico



**ORGANIZACIÓN  
PANAMERICANA  
DE LA SALUD**

*"Se recomienda fortalecer la búsqueda activa de casos, incluido el diagnóstico por laboratorio"*

ARCHIVO NADYA MURILLO



**Aspectos de** la jornada de vacunación contra el sarampión instalada el año pasado en la Ciudad Universitaria de la UNAM